

لیلیم (Lilium)

لیلیم کو عام زبان میں لیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق Liliaceae خاندان سے ہے۔ لیلیم کا آبائی وطن چائے اور جاپان ہیں۔ اس کے خاندان کی تقریباً 100 اقسام ہیں۔ لیلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلاً شہنائی نما۔ ٹریمپٹ (Trumpet)، پورپین۔ اور مینٹل (Oriental)، ایشیائی۔ ایشیا ٹک (Asiatic)، مارٹاگون (Martagon) اور لانگیفلورم (Longiflorum)۔ کاروباری لحاظ سے اور مینٹل اور ایشیا ٹک گروپ کی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ عام طور پر ان کی کاشت سرد علاقوں میں کی جاتی ہے۔ تاہم یہ گرم علاقوں میں بھی سایہ دار جگہوں یا سایہ دار جالی استعمال کر کے اگائی جاسکتی ہے۔ یہ بھی بلب سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں جن میں سفید، سرخ، گلابی یا مختلف رنگ کے دھاریوں والے پھول ہوتے ہیں۔ تنے پر نوکدار پتے ہوتے ہیں اور تنے کے آخر پر 3 سے 12 تک پھول لگتے ہیں۔ تنے کی لمبائی 50 سینٹی میٹر سے 100 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ پھول کا سائز 12.5 سینٹی میٹر تا 18 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کی شکل قیف سے ملتی جلتی ہے بعض اقسام کے پھولوں میں خوشبو بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بطور کٹ فلاور بہت منافع بخش پھول ہے۔ یہ گملوں میں یا کیاریوں میں لگایا جاسکتا ہے۔

زمین کا انتخاب: زرخیز، نرم اور اچھے نکاس والی زمین کا انتخاب کریں۔ زمین کی pH 7 ہونی چاہیے۔

ٹمپرینج: جڑوں کی نشوونما کیلئے 18 سینٹی گریڈ تا 20 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت درکار ہوتا ہے جبکہ تنے کی بڑھوتری کیلئے 14 سینٹی گریڈ تا 18 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ضروری ہے۔ اس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کیلئے دن کا درجہ حرارت تقریباً 27 سینٹی گریڈ اور رات کا درجہ حرارت 18 سینٹی گریڈ موزوں ہے۔

افزائش: اس کی افزائش بذریعہ بلب، بلبلیٹ اور چھلکوں (Scales) سے کی جاسکتی ہے۔

بلب لگانے کا موسم: ستمبر تا نومبر

بلب لگانا: بلب کھیلوں پر لگائے جاتے ہیں۔ کھیل سے کھیل کا فاصلہ 2 فٹ اور بلب سے بلب کا فاصلہ 6 تا 9 انچ رکھا جاتا ہے۔

پانی دینا: بلب لگانے کو فوراً بعد پانی لگادیں۔ پانی دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پانی بلب سے نیچے رہے اور پانی کھیل کے اوپر نہ چڑھے۔ اس سے زمین سخت ہو جاتی ہے اور اگاؤ پر برا اثر پڑتا ہے اور بلب کے گلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری کیلئے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین میں نمی موجود رہنی چاہیے تاہم پانی زمین میں کھڑا نہ ہو۔

زمین کی تیاری: بلب لگانے سے پہلے زمین اچھی طرح تیار کریں۔ بلب لگانے سے کم از کم ایک مہینہ پہلے گوبر کی کھاڈ ڈالیں۔ گوبر کی گلی سڑی کھاڈ پانچ ٹرائی فی ایکڑ ڈالیں۔ تین سے چار ہل چلائیں۔ روٹاویٹر کا استعمال کریں تاکہ مٹی باریک ہو جائے اور کھیلیاں بنانے اور بلب لگانے میں آسانی ہو۔

کھاڈوں کا استعمال: نائٹرو فاس تین بوری فی ایکڑ کے حساب سے زمین تیار کرتے وقت بلب لگانے سے پہلے ڈالیں۔ اس کے بعد امونیم نائٹریٹ کھاڈ تین بوری فی ایکڑ کے حساب سے پہلی گوڈی کے ساتھ ڈالیں جب پودے تقریباً چھ انچ کے ہو جائیں۔ جب پودوں پر پھولوں کی ڈوڈیاں بننا شروع ہوں تو پونٹاشیم سلفیٹ کھاڈ دو بوری فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ اس سے پھول کی کوالٹی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔

ضروریات کیڑے اور ان کا انسداد: لیلی پر ایفڈ، بلب کی مائیٹس، تھرپس اور بورر کا حملہ ہوتا ہے۔ ایفڈ اور تھرپس کو کنٹرول کرنے کے لئے chloropyriphos, confidor یا کوئی اور دوائی استعمال کریں۔ جبکہ بلب کی مائیٹس اور بورر کے انسداد کیلئے 0.05% Endosulfan کا سپرے کریں۔

بیماریاں:

للی پر Grey mould, Foot Rot, Sotorage Rot اور Brown scale جیسی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔

(۱) گرے مولڈ (Grey Mould): اس سے پودے کے اوپر کے حصے متاثر ہوتے ہیں۔ پتوں پر گول بھورے رنگ کے دھبے بنتے ہیں پھول بھی خراب ہوتے ہیں۔ متاثرہ پھول بھورا ہو جاتا ہے اور اس پر کالا سفوف بن جاتا ہے۔

انسداد: کم پانی دیں۔ پودوں کی تعداد کم کریں اور پھپھوندی کش دوا ایلپیٹ (Aliete) یا مینکو زیب (Mancozeb) بحساب 2 گرام فی لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کریں۔

(۲) Foot Rot: یہ زمین کی سطح سے تنوں پر حملہ کرتی ہے۔ پودے مرجھا کر مر جاتے ہیں۔

انسداد: کا پرا کسی کلورائیڈ کا سپرے کریں اور متاثرہ پودے کھیت سے نکال دیں۔ پانی روک دیں۔

(۳) Storage Rot: یہ بلب سے سکیل کو الگ کرتی ہے۔ بلب گل سڑ جاتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ پودے سے اگنے والے پودے پیلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں خشک ہو جاتے ہیں۔

انسداد: بلب کو پھپھوندی کش بینلیٹ (Benlate) دوائی لگا کر سٹور کریں۔

(۴) Brown scale: یہ باہر والے سکیلز پر حملہ کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے دھبے سکیل پر بن جاتے ہیں۔

انسداد: پانی کی زیادتی نہ ہو۔ بلب کو Bavistin یا کوئی اور Fungicide لگا کر بوئیں۔

پھولوں کی برداشت: پھول اس وقت کاٹیں جب وہ مکمل طور پر تیار ہو جائیں اور رنگ دینا شروع کریں اور کھلنے کے قریب ہوں۔ تنے کو زمین کی سطح سے کاٹیں۔

Vase Life: للی کے پھول کی گلدان میں تازہ رہنے کی مدت 10 تا 14 دن ہے۔

زمین سے بلب نکالنا: جب پودے کے اوپر والا حصہ سوکھ جائے تو بلب زمین سے نکال لیں۔ زمین سے نکالنے کے بعد بلب اچھی طرح صاف کر لیں۔ خشک کریں پھپھوندی کش دوا لگا کر 4- تا 2 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر سٹور کریں۔ Bulblets کو بھی الگ کر کے صاف کریں اور دوائی لگا کر سٹور کر لیں اور اگلے موسم میں پھر لگائیں۔

اقسام:

Brandisi, Tiber, Original Love, Brunello, Salman classic, Fangio, Lombardio,

Sorbonne, Crystal Blanca, Montezuma.

للییم (للی) کافی اکیڑ لاگت اور آمدنی کا گوشوارہ

خرچہ (روپے)	نوعیت خرچہ
2500	زمین کی تیاری
17500	گوبر کی کھاد (پانچ ٹرائلی)
2000	کھیلیاں بنانا
2613600	بلب کا خرچہ (43560 بلب)
2000	بلب لگانے کا خرچہ
16300	کھاد
	ناٹروفاس (3 بوری)
	کیلشیم امونیم ناٹریٹ (2 بوری)
	پوٹاشیم سلفیٹ (1 بوری)
10000	آپاشی
3000	گوڈی
2000	ادویات / سپرے
100000	ٹنل کیلئے بانس
200000	ٹنل کیلئے گرین نیٹ
5000	پھولوں کی برداشت
5000	پھول منڈی تک لے جانے کا خرچہ / تراسیلی اخراجات
2978900 روپے	میزان:

$$\begin{array}{rcl} \text{روپے } 6525000 & = & \text{آمدنی بحساب } 150 \text{ روپے فی پھول} \\ \text{روپے } 3546100 & = & \text{خالص منافع} \end{array}$$